

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient!

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Gebrauchsinformation

29999

56833.00.00

Daktarin Creme

Wirkstoff: Miconazolnitrat

Zusammensetzung

Arzneilich wirksamer Bestandteil:

1 g Creme enthält 20 mg Miconazolnitrat.

Sonstige Bestandteile:

Gemisch von Mono- und Distearinsäureestern mit Ethylenglycol und Polyoxyethylenglycol, Poly(oxy)-ethylenglyceroltrioleat, dickflüssiges Paraffin, Butylhydroxyanisol, Benzoesäure, gereinigtes Wasser.

Darreichungsform und Inhalt

Tube mit 30 g Creme (N2)

Stoff- oder Indikationsgruppe

Arzneimittel mit breitem Wirkungsspektrum zur Behandlung von Pilzkrankungen

Pharmazeutischer Unternehmer:

EMRA-MED Arzneimittel GmbH, D-22946 Trittau

Telefon 04154/806-0, Telefax 04154/806-354

Für das Inverkehrbringen in der Bundesrepublik Deutschland freigegeben durch

MPA Pharma GmbH, D-22946 Trittau.

Anwendungsgebiete

Pilzkrankungen der Haut, Hautfalten, Finger- und Zehenzwischenräume sowie oberflächliche Infektionen durch Hefepilze.

Gegenanzeigen

Wann darf Daktarin Creme nicht angewendet werden?

Bei Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder die sonstigen Bestandteile darf Daktarin Creme nicht angewendet werden.

Was müssen Sie in Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

Da der Wirkstoff bei lokaler Anwendung praktisch nicht vom Körper aufgenommen wird, kann Daktarin Creme während der Schwangerschaft und Stillzeit angewandt werden.

Um den direkten Kontakt des Säuglings mit Daktarin Creme zu vermeiden, sollten stillende Frauen Daktarin Creme während der gesamten Stillzeit nicht im Brustbereich anwenden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise

Was müssen Sie vor der Anwendung von Daktarin Creme beachten?

Daktarin Creme nicht in die Augen bringen!

Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Daktarin Creme ist erforderlich

Butylhydroxyanisol kann örtlich begrenzt Hautreizungen (z.B. Kontaktdermatitis), Reizungen der Augen und der Schleimhäute hervorrufen.

Benzoesäure kann leichte Reizungen an Haut, Augen und Schleimhäuten auslösen.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Bisher nicht bekannt.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt Daktarin Creme nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da Daktarin Creme sonst nicht richtig wirken kann.

Wieviel von, wie oft und wie sollten Sie Daktarin Creme anwenden?

1- bis 2-mal am Tag etwas Creme auf die erkrankte Hautregion auftragen und leicht mit dem Finger einmassieren.

Wie lange sollten Sie Daktarin Creme anwenden?

Die Behandlung muss nach dem Abklingen der Beschwerden noch mindestens 14 Tage lang fortgesetzt werden, um ein Wiederauftreten zu verhindern.

Anwendungsfehler und Überdosierung

Was ist zu tun, wenn Daktarin Creme in zu großen Mengen angewendet wurde (beabsichtigte oder versehentliche Überdosierung)?

Bisher sind keine unerwünschten Wirkungen bei zu häufiger Anwendung beobachtet worden.

Was ist zu tun, wenn Daktarin Creme versehentlich eingenommen wurde?

Bei versehentlicher Einnahme sollten Sie Ihren Arzt aufsuchen.

Hinweis für den Arzt:

Bei der Einnahme von großen Mengen des Arzneimittels sollte ggf. eine Magenspülung vorgenommen werden.

Nebenwirkungen

Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Daktarin Creme auftreten?

Selten können Überempfindlichkeitsreaktionen wie z.B. Rötung, Brennen, Juckreiz auftreten.

Hinweis:

Beim Auftreten von allergischen Reaktionen sollte die Behandlung abgebrochen werden.

Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels

Das Arzneimittel soll nach Ablauf des auf Behältnis und äußerer Umhüllung angegebenen Verfalldatums nicht mehr angewendet werden.

Wie ist Daktarin Creme aufzubewahren?

Nicht über + 25 °C lagern!

Stand der Information

Oktober 2002

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!

WEITERE ANGABEN

Eigenschaften

Der in Daktarin Creme enthaltene Wirkstoff Miconazolnitrat ist eine Originalsubstanz der Janssen-Forschung. Er verfügt über einen breiten Wirkungsbereich gegen Dermatophyten, Schimmel-, Hefe- und sonstige Pilze. Daktarin Creme führt nach dem Auftragen auf die erkrankten Hautbezirke zu einer schnelleren Besserung der subjektiven Beschwerden (Juckreiz) und führt zur Abheilung der betroffenen Hautbezirke.

Das Auftragen von Daktarin Creme ist angenehm, denn sie fettet nicht und zieht rasch in die Haut ein und hinterlässt auf der Kleidung keine Flecken. Zudem verfügt Daktarin Creme über eine ausgezeichnete Hautverträglichkeit.

Anmerkung

Der therapeutische Erfolg wird unterstützt durch hygienische Maßnahmen, wie das tägliche Wechseln von Wäsche und Strümpfen.

Gebrauchsanleitung

So machen Sie die Tube der Daktarin Creme gebrauchsfertig:

Schrauben Sie die Verschlusskappe ab und setzen Sie sie umgekehrt auf die Tube.

Damit durchstoßen Sie dann die Versiegelung.